

ПРО РЕАГУВАННЯ НА СПАЛАХ ПОЛІОМІЄЛІТУ

В Україні зареєстровано 2 випадки паралітичного поліомієліту серед дітей. Захворіли діти з Рівненської та Закарпатської областей. При обстеженні 19 контактних виявили, що діти виділяють вірус з фекаліями, але не мають симптомів хвороби. Вірус поліомієліту передається дуже легко від людини до людини: через слину, через іграшки, овочі, фрукти, воду. На 1 паралітичний випадок припадає 100 з симптомами застуди або харчового отруєння. Протівірусних ліків проти поліомієліту досі не винайшли!

Основні симптоми паралітичного поліомієліту: парези і паралічі (порушення роботи м'язів кінцівок, серцевого та дихальних м'язів). Людина на все життя може залишитися інвалідом або померти.

Єдиний вид боротьби – це вакцинація. Використовують 2 види вакцини. Інактивована (вводиться в м'яз) у віці 2 місяці, 4 місяці. Якщо хтось розпочинає курс щеплень пізніше, то першу і другу дозу завжди отримує інактивованою вакциною.

У віці 6 місяців, 18 місяців 6 і 14 років діти отримують живу поліомієлітну вакцину у вигляді крапель.

Вакцинація проти поліомієліту проводиться з 1963 року. В світі залишились лише 2 країни, де циркулює дикий поліовірус – Афганістан і Пакістан. В Україні спалах викликаний дериватом вакцинного штаму поліовірусу 2-го типу. Для того, щоб спалах подолати і припинити циркуляцію вірусу в Україні, з 1 по 22 лютого 2022 року проводиться перший раунд вакцинації дітей інактивованою вакциною французького виробництва у пунктах щеплень. Провакцинувати потрібно всіх дітей віком до 6 років хто з різних причин не був вакцинований проти поліомієліту.

Зателефонуйте своєму сімейному лікарю, щоб дізнатись, чи належним чином вакциновані Ваші діти, передивіться Паспорти вакцинації.

**Єдиний можливий опір поліомієліту – це вакцинація.
Захистіть Ваших дітей від поліомієліту**